

四川润尔科技有限公司

企业简介

公司专业从事植物生长调节剂和高效水溶性肥料的研发、生产和销售，产品广泛应用于农业种植、园艺生产、园林养护、林业植保等领域。截止 2025 年 6 月 30 日，公司具有农药登记证 141 个，肥料登记(含备案)产品 71 个。原、辅料来源情况：原、辅料有固定的供货渠道，与供货单位签有长期合同，合同及发票齐全。公司高度重视产品质量，视产品质量为企业之本，通过贯穿产品开发设计、供应链、生产管理和售后服务等方面，全流程质量控制体系来确保产品的品质。建立了一套严格完整的质量控制和管理体系，并通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证。绿色生资标志使用情况：按照证书核准的产品名称、商品名称、获证单位、产品编号和标志许可期限等正确使用绿色生资标志。

产品特点

0.1%氯吡脲可溶液剂：能促进作物吸收矿物质元素，提高蛋白质和糖分含量，从而达到农作物长根、生叶，增加分蘖，早熟，保花保果，改善品质。



国光® 大果®
施特优® 果盼® 座瓜灵®

农药登记证号: PD20082370
农药生产许可证号: 农药许(川)0001
产品质量标准号: Q/91510185MA68HDG804-49-2018

产品性能: 本品属活性较高的植物生长调节剂, 具有细胞分裂素活性, 能促进细胞分裂、分化, 器官形成和蛋白质合成, 可提高光合作用。用于瓜果类作物如甜瓜、葡萄、猕猴桃、脐橙、荔枝等, 具有促进保花保果、加速幼果生长发育、膨大果实、增加产量等作用。

注意事项: 1. 施药时应均匀、周到, 不宜重复用药。若不按照推荐使用技术和使用方法施用, 均可能会对作物产生药害。2. 用药最适浓度因品种、气温、栽培管理而异, 凡未用过此药的作物品种和地区, 应先试用, 切忌滥用。初次使用宜先从低浓度用起, 浓度过高可引起果实空心、畸形僵果等不良现象。3. 使用本品能使发育不良的小瓜果, 授粉不良的畸形果保留, 请及时疏除, 保留适当的座瓜、载果量。4. 本品不具备营养功能, 主要靠调节养分分配及流向起作用, 应结合科学良好的肥水管理, 合理负载, 并做好园区通风、培养强壮的树势等配套管理, 以利于药剂效果表现。5. 本品应现配现用, 久置药效降低。6. 应在阴天或晴天早晚使用, 严禁高温烈日用药, 施后6小时内遇雨应补施。7. 使用本品时应穿戴防护服、面罩和手套等防护用品, 避免吸入药液。施药期间不可吃东西、喝水和吸烟。施药后应及时洗手和洗脸。8. 本品对蜜蜂和家蚕低毒, 蚕室附近禁用, 周围蜜源植物花期禁用。9. 本品对鱼、蟹等水生生物中毒, 水产养殖区附近慎用, 使用时应避免污染河流、湖泊、池塘等。10. 禁止在池塘等水域内清洗施药器具或将清洗器具的废水倒入河流、池塘等水源。11. 用过的包装物及未用完的药液不能随意丢弃, 也不能做他用, 应交当地农业部门或环保部门指定的单位进行回收处理。12. 本品能否与其他农药、肥料等产品混用请咨询当地农业技术推广部门, 以免混用不当产生药害。13. 孕妇及哺乳期妇女应避免接触此药。

登记证持有人: 四川润尔科技有限公司 电话: 028-66876901/66876902
住所和生产地址: 四川省成都市简阳市平泉街道龙佛大道500号
邮编: 641400 传真: 028-88430473 网址: www.scggic.com

印可变
二维码

植物生长调节剂

氯吡脞

有效成分及其含量:
氯吡脞0.1%
剂型: 可溶液剂

低毒

净含量: 1升

使用范围和使用方法:

作物/场所	防治对象	用药量(制剂量/亩)	施用方式
西瓜	调节生长	30-40倍液	涂瓜柄
脐橙	调节生长	60-100倍液	涂抹幼果果柄蜜盘
葡萄	增产	50-100倍液	浸幼果穗
甜瓜	调节生长	100-200倍液	涂抹瓜胎
葡萄	果实增大	50-100倍液	浸幼果穗
黄瓜	调节生长	60-100倍液	浸瓜胎
荔枝树	调节生长	1500-2500倍	喷雾
猕猴桃	调节生长、增产	50-200倍液	浸幼果

使用技术要求: 1. 西瓜、甜瓜: (1)在雌花开放当天或前1-2天, 均匀喷雾或浸瓜胎1次; (2)最佳使用时期和兑水量受品种、气温、生态区、栽培管理水平的影响, 应根据实际情况灵活调整, 通常情况下气温低于18度, 每5毫升西瓜兑水0.75-1.5克左右, 甜瓜兑水0.75-1.5克左右; 18-24度, 每5毫升西瓜兑水0.75-1.5克, 甜瓜兑水1-1.5克; 25-30度, 每5毫升西瓜兑水0.75-1.5克, 甜瓜兑水1-2克; (3)高浓度使用, 用药不均匀或用量过大, 易引起畸形瓜、裂瓜、瓜苦等副作用; (4)薄皮瓜、易裂瓜、31度以上高温禁用; (5)不良环境下应多留瓜, 待瓜胎座稳后再定瓜。2. 黄瓜: 一般稀释100-150倍, 于黄瓜雌花开放当天或前一天用药液均匀浸瓜胎1次。3. 葡萄: 谢花后15天左右, 浸葡萄果穗, 药液要浸没整个果穗, 不同品种、地区和温度情况, 最适浓度有所不同, 一般稀释100-150倍(每10毫升兑水1-1.5公斤), 建议从低浓度用起。4. 本品用于葡萄, 不同品种, 不同的使用目的, 使用技术差异性较大; 本品常用于巨峰、京亚、藤稔、夏黑、无核白等, 初次使用无用药经验的, 不同的使用目的及新品种使用本品, 务必在使用前咨询并小面积试用成功后再扩大使用。5. 猕猴桃: 在谢花后20-25天, 浸幼果1次。6. 脐橙: 在果实膨大期使用1次。7. 荔枝树: 谢花后第一次生理落果前和第二次生理落果前喷雾施药各一次, 重点喷施效果。本品在葡萄上施用1次, 安全间隔期为38天。在荔枝上最多用药2次, 推荐安全间隔期25天, 在猕猴桃、甜瓜、西瓜、黄瓜、脐橙上只用药1次, 安全间隔期为收获期, 切勿超剂量使用避免药害。

中毒急救措施: 1. 若不慎接触皮肤, 用大量清水冲洗。若溅入眼睛, 用大量清水冲洗至少15分钟, 严重时就医。若误服, 及时携标签到医院对症治疗。中毒急救电话: 中国预防医学科学院中毒控制中心24小时服务电话: 010-83132345。

储存和运输方法: 本产品应贮存于干燥、通风和阴凉的库房中, 防止受潮、日晒, 远离热源或热源, 置于儿童触及不到之处, 并加锁。不得与食品、饮料、粮食、饲料等混合储运。备注: 质量浓度1克/升。质量保质期: 2年 生产日期及批号见包装封印或喷码



0.1%氯吡脞可溶液剂产品标签

0.1%三十烷醇微乳剂: 能促进作物吸收矿物质元素, 提高蛋白质和糖分含量, 从而达到农作物长根、生叶, 增加分蘖, 早熟, 保花保果, 改善品质。



优丰®



菇动力®

三十烷醇

有效成分及其含量:
三十烷醇0.1%
剂型: 微乳剂

低毒



登记证持有人: 四川润尔科技有限公司

植物生长调节剂

农药登记证号: PD20080872
农药生产许可证号: 农药许(川)0001
产品质量标准号: Q/91510185MA68HDG804-26

产品性能: 本品能促进植物的生长、分化和发育, 促进作物吸收矿物质元素, 提高蛋白质和糖分含量, 改善产品品质等, 还能促进农作物长根、生叶、花芽分化, 增加分蘖, 促进早熟, 保花保果。

使用范围和使用方法:

作物/场所	防治对象	用药量(制剂量/亩)	施用方式
高粱	调节生长	1000-2000倍液	喷雾
花生	调节生长	1000-1333倍液	喷雾
平菇	调节生长	1333-2000倍液	喷雾
小麦	调节生长	1700-2200倍液	喷雾

使用技术要求: 小麦: 在小麦孕穗期, 拔节期各均匀喷雾一次, 花生: 用0.75-1.0毫克/千克药液(稀释1000-1333倍液)在苗期, 开花期前后各喷一次, 两次用药间隔10-15天, 平菇: 用0.5-0.75毫克/千克药液(稀释1333-2000倍液)在每批平菇现苗期喷雾药一遍1-2次, 间隔3天左右(可将菌袋直立地面, 上端开口, 用手持式喷雾器至菌盖表面有薄薄一层雾滴即可), 高粱: 用0.5-1毫克/千克药液(稀释1000-2000倍液)在苗期, 拔节期, 初花期各施药一次, 每季最多使用次数: 小麦、花生、平菇各2次, 高粱3次。

净含量: 15毫升

住所和生产地址: 四川省成都市简阳市平泉街道龙佛大道500号 邮编: 641400
电话: 028-66876901/66876902
传真: 028-88430473 质量保质期: 2年
生产日期及批号见包装封印或喷码
完整标签内容详见使用说明书

印可变
二维码

植物生长调节剂

0.1%三十烷醇微乳剂产品标签

含氨基酸水溶肥料（稀施美）：含作物生长所需的多种氨基酸和微量元素，对作物因缺硼、锌等引起的小叶、黄叶、花而不实、空壳秕粒，小果、缩果、畸形果，落花落果，根系发育不良等生理缺素症有良好的防效。施后叶绿叶健，减少落花落果，促进籽粒饱满，提高产量。

含氨基酸水溶肥料 微量元素型 GG

注意事项：1、久置如有沉淀，不影响效果，搅匀后用。2、喷后6小时内遇雨应补喷。3、勿与碱性药肥混用。4、高温干旱及大棚内使用，适当增加兑水量。5、运输和贮存中应防潮、防晒、防破裂。6、贮存于通风干燥处，勿与粮食、食品、饲料等物品同贮同运。

汞(Hg) ≤ 5mg/kg; 砷(As) ≤ 10mg/kg; 镉(Cd) ≤ 10mg/kg; 铅(Pb) ≤ 50mg/kg; 铬(Cr) ≤ 50mg/kg; 水不溶物 ≤ 50g/L; 氯(Cl) : 135g/L; 硫(S) ≤ 30g/L; 钠(Na) ≤ 30g/L; pH: 4.0; 铊(Tl) ≤ 2.5mg/kg; 缩二脲 ≤ 1.5%;

生产企业名称：四川润尔科技有限公司

生产地址：成都市简阳市平泉镇

电话：028-66876901

传真：028-88430473 邮编：641400



肥料登记证号：农肥(2018)准字8056号
执行标准号：NY 1429-2010 产品形态：水剂

作用特点：本品含氨基酸及微量元素铁、锌、硼。可缓解因缺素引起的黄叶、小叶、簇叶、裂果、曲果、生长发育异常等生理缺素症。施后生长发育快，植株健壮，促根系发达，提高品质和产量。

用法用量：稀释800-1000倍（每公顷本品用量675-900毫升），整个生育期均可喷施，每次间隔10-15天，可连喷2-3次。

适用于：水稻、小麦、玉米、花生、棉花、橙、苹果、核桃、百合、菊花、花椒、茶叶、烟草、马铃薯、萝卜等根菜类、薯芋类、茼蒿、甘蓝等绿叶菜类、蕹菜类；西瓜、黄瓜等茄果类、瓜类；葡萄、草莓等浆果类；香菇、木耳等食用菌类；荔枝、杨梅等热带水果。

有效期：36个月

生产日期及批号见包装封印或喷码

净含量：100毫升



含氨基酸水溶肥料产品标签

产品推广应用情况

0.1%氯吡脲可溶液剂、0.1%三十烷醇微乳剂和含氨基酸水溶肥料（稀施美）均属于公司重点推广的产品，在全国各地均有销售，经过多年的销售和推广，在登记作物上的使用面积广，因产品安全高效，获得经销商、零售商和种植户一致好评。近几年3个产品年生产量均在500吨以上，2024年产品生产量依次为710吨、970吨和520吨，年销售额合计2500余万元。